

Estudio de la eficacia y tolerancia de una fórmula hiperproteica específicamente diseñada para pacientes hiperglicémicos o diabéticos

Autores

Mesejo A., Acosta J., y colaboradores.

Resultados preliminares, estudio en curso.

Objetivos del estudio: Valorar el efecto de una fórmula enteral hiperproteica con elevado aporte de grasas en el control glicémico de pacientes críticos en situación hiperglicémica, frente a una fórmula de control hiperproteica.

Metodología: Se han estudiado 30 pacientes de UCI diabéticos o hiperglicémicos (50% de la muestra prevista).

Resultados: Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto a edad, APACHE II, antecedentes de diabetes, de corticoterapia y de sepsis al ingreso. En el análisis preliminar de los primeros pacientes, el grupo nutrido con Novasource® Diabet Plus mostró frente a la dieta de control: 1.: Reducción de los niveles de glicemia. 2.: Disminución de las necesidades de insulina. 3.: Excelente tolerancia de ambas dietas ya que no hubo diferencias significativas en la incidencia de complicaciones digestivas entre ambos grupos.

	Novasource® Diabet Plus n= 15	Isosource® Protein n= 15	p
Glicemias digitales	170,1 (55,60)	210 (66,16)	0,08
Glicemias plasmáticas	185,8 (50,36)	217,7 (51,17)	0,09
U/insulina	18,3 (21,17)	38,2 (33,91)	0,07